

INFORMACJA DLA PACJENTA LECZENIE GUZKÓW KRWAWNICZYCH (HEMOROIDÓW) METODĄ SKLEROTERAPII

1. Na czym polega leczenie.

Leczenie guzków krwawniczych (hemoroidów) należy do metod instrumentalnych leczenia hemoroidów i polega na wstrzyknięciu 3% aethoxysclerolu (polidokanolu), podśluzówkowo, u podstawy każdego guzka. W jedno miejsce wstrzykuje się około 2-5 ml środka sklerotyzującego. Do leczenia hemoroidów tym sposobem nadają się guzki krwawnicze I i II i III stopnia. Skuteczność leczenia ocenia się na ok 90%. W szczególnych przypadkach zabieg można wykonać po stwierdzeniu hemoroidów IV stopnia w celu złagodzenia dolegliwości przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Skuteczność leczenia ocenia się na ok 90%.

Zabieg wykonuje się w ułożeniu na brzuchu lub litotomijnym (ginekologicznym). Czas trwania zabiegu wynosi około 30 min. Zabieg nie wymaga znieczulenia ponieważ wykonuje się go w strefie jelita pozbawionego unerwienia czuciowego. Może być jednak odczuwany lekki dyskomfort w czasie wstrzykiwania oraz uczucie ciepła.

2. Przygotowanie do zabiegu.

Do przygotowania jelita do zabiegu należy użyć środka **Enema** lub **Rectanal**. Obydwa środki dostępne są w aptekach i sprzedawane bez recepty. Przygotowanie polega na oczyszczeniu jelita przy pomocy tych środków, jeden raz wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg oraz jeden raz w dniu zabiegu, 1-2 godziny przed zabiegiem. Poza tym lekarz może zlecić inne leki, które należy przyjąć zgodnie z uzyskanymi wskazówkami.

3. Ewentualne powikłania i postępowanie w przypadku ich wystąpienia.

W czasie podawania leku może wystąpić reakcja uczuleniowa, tak jak na każdy inny lek. W przypadku pojawienia się złego samopoczucia w czasie zabiegu, należy to bezzwłocznie zgłosić wykonywującemu zabieg.

Zaraz po zabiegu oraz w ciągu kilku po nim następujących dni pacjent/ka/ może odczuwać dyskomfort, czasami parcie na stolec, uczucie ucisku. Wyraźny ból występuje rzadko. Może być wówczas konieczne podawanie środków przeciwbólowych.

Nieduże krwawienie może wystąpić 2-3 dniu po zabiegu. Nie wymaga ono żadnego postępowania.

Bardziej nasilone krwawienie, które wystąpi później (ok. 7-10 dni po zabiegu) oraz gorączka, wymaga kontroli lekarskiej i stosownego postępowania, świadczy ono bowiem o miejscowym powikłaniu.

U mężczyzny bardzo rzadko może wystąpić jako powikłanie zapalenie gruczołu krokowego, zatrzymanie moczu (przejściowe) krwiomocz oraz hematospermia (pojawienie się krwi w nasieniu) i miejscowe ropnie. Powikłania takie wymagają kontroli lekarskiej.

W wyniku zabiegu może dojść do przeniesienia zakażenia wirusowego zapalenia wątroby typu B,C, HIV.

4. Postępowanie po zabiegu.

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent/ka zazwyczaj wraca do normalnych, codziennych czynności. W niektórych przypadkach, np. z uwagi na szczególne warunki pracy lub inne okoliczności, orzeka się o niezdolności do pracy. Nie przewiduje się specjalnych wskazówek dietetycznych, należy jednak dbać o prawidłowe codzienne wypróżniania, unikając zaparc.

ZGODA NA LECZENIE GUZKÓW KRWAWNICZYCH (HEMOROIDÓW) METODĄ SKLEROTERAPII

Z pacjentką/em przeprowadzono rozmowę, podczas której w sposób zrozumiały przedstawiłam/em celowość przeprowadzenia zabiegu, jego przewidywany przebieg i możliwe do wystąpienia powikłania. Pacjentkę/ta zakwalifikowano do zabiegu.

.....
Pieczętka i podpis lekarza

Po rozmowie z lekarzem, podczas której mogłam/em zadawać pytania i otrzymałam/em wyczerpujące odpowiedzi, po zapoznaniu się z rodzajem zabiegu, licząc się z możliwością wystąpienia powikłań oraz śródoperacyjną zmianą postępowania dyktowaną wskazaniami medycznymi, wyrażam zgodę na zabieg skleroterapii hemoroidów.

.....
Imię i Nazwisko pacjenta

.....
Data i podpis pacjenta